

INJECTION

Abrilada[™]
adalimumab-afzb

DEMOSTRADO



SIN CITRATO

SERVICIOS Y APOYO
DE PFIZER

Su guía para el tratamiento con ABRILADA. Vamos.

Inyección: 40 mg/0.8 ml, 20 mg/0.4 ml

Biosimilar intercambiable a Humira[®] (adalimumab)*, de Pfizer, aprobado por la FDA

No es una paciente real.

*ABRILADA es intercambiable para las indicaciones de uso, formas farmacéuticas, concentraciones y vías de administración descritas en la [Información de prescripción](#).

INFORMACIÓN SELECCIONADA DE SEGURIDAD

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre ABRILADA?

Debe comentar los posibles beneficios y riesgos de ABRILADA con su médico. ABRILADA es un medicamento bloqueador del factor de necrosis tumoral (tumor necrosis factor, TNF) que puede reducir la capacidad de su sistema inmunitario para combatir las infecciones. No debe empezar a recibir ABRILADA si tiene algún tipo de infección, a menos que su médico le diga que está bien.

- **Se han producido infecciones graves en personas que usan productos con adalimumab. Dichas infecciones graves incluyen tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus que pueden extenderse por todo el cuerpo. Algunas personas han fallecido a causa de estas infecciones.** Su médico debe hacerle pruebas de TB antes de comenzar con ABRILADA y comprobar atentamente si hay signos y síntomas de TB durante el tratamiento con ABRILADA, incluso si la prueba de TB fue negativa. Si su médico cree que está en riesgo, se le puede tratar con un medicamento para la TB.
- **Cáncer.** Para niños y adultos que reciben inhibidores del TNF, incluido ABRILADA, la probabilidad de desarrollar linfoma u otros tipos de cáncer puede aumentar. Ha habido casos de tipos de cáncer inusuales en niños, adolescentes y adultos jóvenes que usaban inhibidores del TNF. Algunas personas desarrollaron un tipo raro de cáncer llamado linfoma hepatoesplénico de células T. Este tipo de cáncer a menudo provoca la muerte. Si utiliza inhibidores del TNF, incluido ABRILADA, puede aumentar su probabilidad de tener dos tipos de cáncer de piel (células basales y células escamosas). Estos tipos no suelen ser potencialmente mortales si se tratan; informe a su médico si tiene una protuberancia o una herida abierta que no se cicatriza.

Consulte la Información seleccionada de seguridad en todo el documento, las Indicaciones de la página 3 y la Información de prescripción completa, incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIAS, la Guía del medicamento y las Instrucciones de uso, disponibles en [ABRILADA.com](#).



No son pacientes reales.

¿Qué es ABRILADA?

ABRILADA es un tratamiento biológico aprobado para ciertas afecciones inflamatorias (indicadas a la derecha). ABRILADA es un biosimilar, una versión muy similar a Humira® (adalimumab), un medicamento biológico que se encuentra disponible desde hace tiempo.

Un biosimilar es aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) de los EE. UU. solo después de que se haya descubierto que no hay diferencias clínicamente significativas con respecto al medicamento biológico original.

Tanto si empieza a recibir ABRILADA como si cambia de Humira, este folleto puede ayudarle a comprender su tratamiento.

Asegúrese de revisar los beneficios y riesgos de ABRILADA, analícelos con su médico y lea la [Guía del medicamento](#) y las [Instrucciones de uso](#) antes de comenzar el tratamiento.

En este folleto también encontrará información sobre los posibles efectos secundarios que se han escrito en forma de preguntas. Hable con su médico sobre estas y otras preguntas que pueda tener sobre ABRILADA.

Para ayudarle a comenzar su proceso de tratamiento con ABRILADA, este folleto también habla sobre los recursos y el posible apoyo financiero de Pfizer.

INFORMACIÓN SELECCIONADA DE SEGURIDAD

¿Qué debo decirle a mi médico ANTES de comenzar con ABRILADA?

Informe al médico sobre todas sus afecciones de salud, incluido si:

- Tiene una infección, está recibiendo tratamiento para una infección o tiene síntomas de una infección.
- Suele padecer de muchas infecciones o infecciones que son recurrentes.
- Tiene diabetes.
- Tiene TB o ha estado en contacto cercano con alguien con TB, o ha nacido, vivido o viajado donde existe un mayor riesgo de contraer TB.

¿Para qué afecciones está aprobado ABRILADA?

ABRILADA es un medicamento llamado inhibidor del factor de necrosis tumoral (TNF) que se utiliza para reducir los signos y síntomas de:

Artritis reumatoide (AR) de moderada a grave en adultos. ABRILADA se puede usar solo, con metotrexato o con algunos otros medicamentos.

Artritis idiopática juvenil (AIJ) poliarticular de moderada a grave en niños de 2 años o más. ABRILADA se puede usar solo o con metotrexato.

Artritis psoriásica (APs) en adultos. ABRILADA se puede usar solo o con algunos otros medicamentos.

Espondilitis anquilosante (EA) en adultos.

Hidradenitis supurativa (HS) de moderada a grave en adultos.

ABRILADA también se utiliza para tratar:

Enfermedad de Crohn (EC) de moderada a grave en adultos y niños de 6 años o más.

Colitis ulcerosa (CU) de moderada a grave en adultos. Se desconoce si los productos de adalimumab son eficaces en personas que dejaron de responder o no pudieron tolerar los medicamentos inhibidores del TNF.

La psoriasis (Ps) en placas crónica (que dura mucho tiempo) de moderada a grave en adultos que tienen la afección en muchas zonas de su cuerpo y que pueden beneficiarse de la administración de inyecciones o comprimidos (terapia sistémica) o fototerapia (tratamiento con luz ultravioleta, sola o con comprimidos).

Uveítis (UV) en adultos. Intermedia no infecciosa (parte media del ojo), **posterior** (parte posterior del ojo) y **panuveítis** (todas las partes del ojo).

Consulte la Información seleccionada de seguridad en todo el documento, las Indicaciones de arriba y la [Información de prescripción completa, incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIAS, la Guía del medicamento y las Instrucciones de uso, disponibles en \[ABRILADA.com\]\(http://ABRILADA.com\).](#)

¿Cómo funciona ABRILADA?

ABRILADA bloquea la acción de una proteína en el cuerpo denominada factor de necrosis tumoral alfa (TNF-alfa). El TNF-alfa es producido por el sistema inmunitario del cuerpo. Las personas con determinadas enfermedades tienen demasiado TNF-alfa, lo cual puede hacer que el sistema inmunitario ataque a partes sanas normales del cuerpo. ABRILADA actúa inhibiendo el TNF-alfa, que en cantidades excesivas puede causar inflamación.

¿Cómo se administra ABRILADA?

ABRILADA se administra mediante una inyección bajo la piel. Su proveedor de atención médica le dirá con qué frecuencia debe recibir una inyección de ABRILADA.

No se inyecte ABRILADA con más frecuencia de la que le ha indicado su proveedor de atención médica.

¿Cómo obtendré mi receta de ABRILADA?

Lo más probable es que una farmacia especializada le entregue su receta de ABRILADA.

Una farmacia especializada proporciona medicamentos utilizados para tratar problemas de salud complejos y crónicos.

Estos medicamentos también pueden necesitar una manipulación especial por parte del farmacéutico y de usted (por ejemplo, almacenamiento especial o planificación detallada del tratamiento).

Su seguro seleccionará una farmacia especializada para usted. La farmacia especializada:


- Preparará su medicamento ABRILADA
- Se comunicará con usted cuando esté listo
- Se lo enviará directamente

INFORMACIÓN SELECCIONADA DE SEGURIDAD

¿Qué debo decirle a mi médico ANTES de comenzar con ABRILADA? (continuación)

Informe al médico sobre todas sus afecciones de salud, incluido si: (continuación)

- Vive o ha vivido en una zona (como los valles de los ríos Ohio y Mississippi) donde hay un mayor riesgo de contraer ciertos tipos de infecciones micóticas, como histoplasmosis, coccidioidomicosis o blastomicosis. Estas infecciones pueden producirse o volverse más graves si usa ABRILADA. Consulte a su médico si no está seguro de haber vivido en estas áreas.
- Tiene o ha tenido hepatitis B.
- Está programado para tener una cirugía mayor.
- Tiene o ha tenido cáncer.



No es una paciente real.

Consulte la [Guía del medicamento](#) y las [Instrucciones de uso](#) disponibles en [ABRILADA.com](#) para obtener instrucciones completas sobre cómo preparar e inyectar ABRILADA de manera correcta.

INFORMACIÓN SELECCIONADA DE SEGURIDAD

¿Qué debo decirle a mi médico ANTES de comenzar con ABRILADA? (continuación)

Informe al médico sobre todas sus afecciones de salud, incluido si: (continuación)

- Tiene entumecimiento u hormigueo o una enfermedad del sistema nervioso como esclerosis múltiple o síndrome de Guillain-Barré.
- Tiene o ha tenido insuficiencia cardíaca.
- Ha recibido recientemente, o tiene programado recibir una vacuna. Los pacientes de ABRILADA pueden recibir vacunas, excepto las vacunas vivas. Los niños deben estar al día de todas las vacunas antes de empezar a recibir ABRILADA.
- Es alérgico a cualquier ingrediente de ABRILADA.

Consulte la [Información seleccionada de seguridad](#) en todo el documento, las [Indicaciones de la página 3](#) y la [Información de prescripción completa](#), incluido el [RECUADRO DE ADVERTENCIAS](#), la [Guía del medicamento](#) y las [Instrucciones de uso](#), disponibles en [ABRILADA.com](#).

No son pacientes reales.

Si es la primera vez que usa una terapia biológica

ABRILADA es un tratamiento biológico que puede ayudar con una variedad de afecciones (consulte la página 3 para conocer las afecciones para las que se ha aprobado ABRILADA). Su médico decidirá si el tratamiento con ABRILADA es adecuado para usted.

Durante su visita a la consulta de su proveedor de atención médica, puede obtener más información sobre:

- ✓ Cómo funciona ABRILADA y posibles efectos secundarios
- ✓ Con qué frecuencia se debe inyectar ABRILADA
- ✓ Cómo Pfizer enCompass® puede ayudar a evaluar su cobertura de seguro para ABRILADA y responder a preguntas adicionales relacionadas con la cobertura que pueda tener

Consulte la sección *Algunas preguntas para su médico* en las páginas 10 a 13 para obtener más información sobre el tratamiento con ABRILADA, y asegúrese de revisar los beneficios y riesgos de ABRILADA con su médico (consulte la información de seguridad en las páginas 14 y 15).

INFORMACIÓN SELECCIONADA DE SEGURIDAD

¿Qué debo decirle a mi médico ANTES de comenzar con ABRILADA? (continuación)

Informe al médico sobre todas sus afecciones de salud, incluido si: (continuación)

- Está embarazada, planea quedar embarazada, está amamantando o planea amamantar.
- Tiene un bebé y estuvo usando ABRILADA durante el embarazo. Informe al médico de su bebé antes de que este reciba cualquier vacuna.

También informe a su médico sobre todos los medicamentos que recibe. No debe usar ABRILADA con ORENCIA® (abatacept), KINERET® (anakinra), REMICADE® (infliximab), ENBREL® (etanercept), CIMZIA® (certolizumab pegol), o SIMPONI® (golimumab). Informe a su médico si alguna vez ha usado RITUXAN® (rituximab), IMURAN® (azatioprina), o PURINETHOL® (mercaptopurina, 6-MP).

¿Cómo uso ABRILADA?

ABRILADA proporciona a los pacientes 2 opciones de autoadministración: la pluma precargada de dosis única y la jeringa precargada de dosis única.

Antes de la inyección, su médico decidirá la dosis correcta de ABRILADA y con qué frecuencia deberá recibirla. No se inyecte ABRILADA con más frecuencia de la que le recetaron.

No intente inyectarse ABRILADA hasta que se le muestre cómo administrar las inyecciones y haya leído y comprenda las [Instrucciones de uso](#). Si su proveedor de atención médica decide que usted o un cuidador puede poner las inyecciones de ABRILADA en casa, usted o su cuidador deben recibir capacitación sobre cómo hacerlo.

ABRILADA se ha diseñado teniendo en cuenta sus necesidades

Sin citrato

- ABRILADA no contiene citrato, lo que puede reducir el dolor en el lugar de inyección

Fabricado sin látex de caucho natural

- Esto puede reducir la probabilidad de sufrir una reacción alérgica

Estabilidad fuera del refrigerador

- ABRILADA debe refrigerarse a una temperatura de 36 °F a 46 °F. Si es necesario, por ejemplo, cuando viaje, ABRILADA puede permanecer fuera del refrigerador hasta por 30 días (a un máximo de 86 °F), fuera de la luz solar directa.



Descargue el Folleto de orientación para viajes de [ABRILADA.com](#) para obtener consejos útiles que pueden facilitar los viajes con ABRILADA.

INFORMACIÓN SELECCIONADA DE SEGURIDAD

¿A qué debo estar atento DESPUÉS de comenzar con ABRILADA?

ABRILADA puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- **Infecciones graves.** Estas incluyen TB e infecciones causadas por virus, hongos o bacterias. Los síntomas relacionados con la TB incluyen tos, fiebre baja, pérdida de peso o pérdida de grasa corporal y músculo.

Llame a su médico o busque atención médica de inmediato si presenta alguno de los síntomas anteriores.

Consulte la *Información seleccionada de seguridad* en todo el documento, las *Indicaciones de la página 3* y la *Información de prescripción completa*, incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIAS, la Guía del medicamento y las Instrucciones de uso, disponibles en [ABRILADA.com](#).

INJECTION
Abrilada[™]
 adalimumab-afzb



Si cambia de Humira a ABRILADA

Si cambia de Humira[®] (adalimumab) a ABRILADA, puede esperar que proporcione resultados de tratamiento similares a los que tenía con Humira. Los resultados individuales pueden variar.

Con ABRILADA, puede esperar una experiencia de tratamiento similar a la de Humira

- ✓ Funciona como Humira
- ✓ Se administra de la misma manera que Humira
- ✓ Está aprobado para todas las indicaciones aptas de Humira*

*ABRILADA está aprobado para todas las indicaciones de Humira excepto para la CU pediátrica, la HS en adolescentes y la UV pediátrica.

INFORMACIÓN SELECCIONADA DE SEGURIDAD

¿A qué debo estar atento DESPUÉS de comenzar con ABRILADA? (continuación)

ABRILADA puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes: (continuación)

- **Infección por hepatitis B en portadores del virus.** Los síntomas incluyen dolores musculares, sensación de mucho cansancio, orina oscura, piel u ojos con aspecto amarillo, poco o ningún apetito, vómitos, deposiciones de color arcilla, fiebre, escalofríos, molestias estomacales y erupción cutánea.
- **Reacciones alérgicas.** Los síntomas de una reacción alérgica grave incluyen urticaria, problemas para respirar e hinchazón de la cara, los ojos, los labios o la boca.
- **Problemas del sistema nervioso.** Los signos y síntomas incluyen entumecimiento u hormigueo, problemas de visión, debilidad en brazos o piernas y mareos.

Llame a su médico o busque atención médica de inmediato si presenta alguno de los síntomas anteriores.

¿Por qué debería cambiar a ABRILADA?

Es posible que su médico haya decidido que ABRILADA es adecuado para tratar su afección. Dado que Humira puede estar funcionando bien, es importante saber que puede esperar una seguridad y eficacia con ABRILADA similares a las que tenía con Humira.

¿Se cambiará la dosis que recibo con ABRILADA?

Su médico determinará la dosis adecuada de ABRILADA y con qué frecuencia debería recibirla. Esto se basará en su afección médica.

Consulte la sección *Algunas preguntas para su médico* en las páginas 10 a 13 para obtener más información sobre su tratamiento con ABRILADA, y asegúrese de revisar los beneficios y riesgos de ABRILADA con su médico.

Pfizer enCompass[®] puede ayudar a evaluar su cobertura de seguro para ABRILADA y responder a preguntas adicionales relacionadas con la cobertura que pueda tener

INFORMACIÓN SELECCIONADA DE SEGURIDAD


¿A qué debo estar atento DESPUÉS de comenzar con ABRILADA? (continuación)

ABRILADA puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes: (continuación)

- **Problemas sanguíneos** (disminución de las células sanguíneas que ayudan a combatir las infecciones o detener el sangrado). Los síntomas incluyen fiebre que no desaparece, hematomas o sangrado muy fácil, o estar muy pálido.
- **Insuficiencia cardíaca** (nueva o que empeora). Los síntomas incluyen dificultad para respirar, hinchazón de los tobillos o los pies y aumento repentino de peso.
- **Reacciones inmunitarias, incluido un síndrome parecido al lupus.** Los síntomas incluyen molestias o dolor en el pecho que no desaparece, dificultad para respirar, dolor en las articulaciones o erupciones en las mejillas o los brazos que empeoran al sol.
- **Problemas hepáticos.** Los síntomas incluyen sensación de mucho cansancio, piel u ojos amarillos, falta de apetito o vómitos y dolor en el lado derecho del estómago (abdomen). Estos problemas pueden provocar insuficiencia hepática y la muerte.
- **Psoriasis** (nueva o que empeora). Los síntomas incluyen manchas escamosas rojas o protuberancias elevadas llenas de pus.

Llame a su médico o busque atención médica de inmediato si presenta alguno de los síntomas anteriores.

Consulte la *Información seleccionada de seguridad* en todo el documento, las *Indicaciones de la página 3* y la *Información de prescripción completa,* incluido el **RECUADRO DE ADVERTENCIAS**, la *Guía del medicamento* y las *Instrucciones de uso*, disponibles en ABRILADA.com.



No es una paciente o proveedor de atención médica real.

Algunas preguntas para su médico

Tanto si es la primera vez que usa adalimumab como si está cambiando de Humira® (adalimumab), es importante que revise la información de seguridad con su proveedor de atención médica, incluidos los posibles efectos secundarios y los medicamentos que debe evitar durante el tratamiento. Asegúrese de revisar los beneficios y los riesgos de ABRILADA con su médico, y de leer la [Guía del medicamento](#) antes de comenzar el tratamiento.

¿Hay algún efecto secundario que deba conocer antes de comenzar el tratamiento con ABRILADA?

ABRILADA puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- **Cáncer**
 - Para niños y adultos que reciben inhibidores del TNF, incluido ABRILADA, la probabilidad de contraer cáncer puede aumentar.
 - Ha habido casos de tipos de cáncer inusuales en niños, adolescentes y adultos jóvenes que usaban inhibidores del TNF.
 - Las personas con AR, especialmente con AR más grave, pueden tener una mayor probabilidad de padecer un tipo de cáncer llamado linfoma.
 - Si utiliza inhibidores del TNF, incluido ABRILADA, puede aumentar su probabilidad de padecer 2 tipos de cáncer de piel (cáncer de células basales y cáncer de células escamosas de la piel). Estos tipos de cáncer no suelen ser potencialmente mortales si se tratan. Informe a su proveedor de atención médica si tiene una protuberancia o una herida abierta que no se cura.

— Algunas personas que recibieron inhibidores del TNF, incluido ABRILADA, desarrollaron un tipo raro de cáncer llamado linfoma hepatoesplénico de células T. Este tipo de cáncer a menudo provoca la muerte. La mayoría de estas personas eran adolescentes de sexo masculino u hombres jóvenes. Además, la mayoría de los pacientes recibían tratamiento para la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa con otro medicamento llamado Imuran® (azatioprina) o Purinethol® (6-mercaptopurina, 6-MP).

• Infecciones graves

Su proveedor de atención médica le examinará para detectar tuberculosis (TB) y le hará una prueba para ver si tiene TB. Si su proveedor de atención médica considera que usted está en riesgo de contraer TB, es posible que reciba tratamiento con medicamentos para la TB antes de comenzar el tratamiento con ABRILADA y durante el tratamiento con ABRILADA.

Incluso si su prueba de TB es negativa, su proveedor de atención médica debe monitorearlo estrictamente para detectar infecciones por TB mientras usa ABRILADA. Las personas que tuvieron una prueba cutánea de TB negativa antes de recibir productos de adalimumab han desarrollado TB activa.

Informe a su proveedor de atención médica si tiene alguno de los siguientes síntomas mientras usa ABRILADA o después de usarlo:

- Tos que no desaparece
- Fiebre baja
- Pérdida de peso
- Pérdida de grasa corporal y músculo (pérdida de masa muscular)

• Infección por hepatitis B en personas portadoras del virus en la sangre

Informe a su proveedor de atención médica si tiene alguno de los siguientes síntomas de una posible infección por hepatitis B:

- Dolores musculares
- Sensación de mucho cansancio
- Orina oscura
- La piel o los ojos se ven amarillos
- Poco o ningún apetito
- Vómitos
- Depositiones de color arcilla
- Fiebre
- Escalofríos
- Molestias estomacales
- Erupción cutánea

• Reacciones alérgicas

Las reacciones alérgicas pueden producirse en personas que usan ABRILADA.

Llame a su proveedor de atención médica o busque ayuda médica de inmediato si tiene alguno de estos síntomas de una reacción alérgica grave:

- Urticaria
- Dificultad para respirar
- Hinchazón de la cara, los ojos, los labios o la boca

Llame a su proveedor de atención médica o busque atención médica de inmediato si presenta alguno de los síntomas anteriores. Puede que se interrumpa su tratamiento con ABRILADA.

Consulte la Información seleccionada de seguridad en todo el documento, las Indicaciones de la página 3 y la Información de prescripción completa, incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIAS, la Guía del medicamento y las Instrucciones de uso, disponibles en ABRILADA.com.

¿Hay algún efecto secundario que deba conocer antes de comenzar el tratamiento con ABRILADA? (continuación)

ABRILADA puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes: (continuación)

• Problemas del sistema nervioso

Los signos y síntomas de un problema del sistema nervioso incluyen: entumecimiento u hormigueo, problemas de visión, debilidad en brazos o piernas y mareos.

• Problemas sanguíneos

Es posible que su cuerpo no produzca suficientes células sanguíneas que ayuden a combatir las infecciones o que ayuden a detener el sangrado. Los síntomas incluyen fiebre que no desaparece, hematomas o sangrado muy fácil, o estar muy pálido.

• Nueva insuficiencia cardíaca o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca que ya padece. Llame de inmediato a su proveedor de atención médica si experimenta síntomas nuevos o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca mientras recibe ABRILADA, incluidos:

- Dificultad para respirar
- Hinchazón de los tobillos o los pies
- Aumento repentino de peso

• Reacciones inmunitarias, incluido un síndrome parecido al lupus.

Los síntomas incluyen molestias o dolor en el pecho que no desaparece, dificultad para respirar, dolor en las articulaciones o erupciones en las mejillas o los brazos que empeoran al sol. Los síntomas pueden mejorar al interrumpir ABRILADA.

• Problemas hepáticos

Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta alguno de estos síntomas:

- Sensación de mucho cansancio
- Dolor en el lado derecho del estómago (abdomen)
- Poco apetito o vómitos
- La piel o los ojos se ven amarillos

• Psoriasis

Algunas personas que usaban productos de adalimumab tenían psoriasis nueva o empeoramiento de la psoriasis que ya tenían. Informe a su proveedor de atención médica si presenta manchas escamosas rojas o protuberancias elevadas llenas de pus. Su proveedor de atención médica puede decidir interrumpir su tratamiento con ABRILADA.

Llame a su proveedor de atención médica o busque atención médica de inmediato si presenta alguno de los síntomas anteriores. Puede que se interrumpa su tratamiento con ABRILADA.

Los efectos secundarios más frecuentes de ABRILADA incluyen los siguientes:

- Reacciones en el lugar de inyección: enrojecimiento, erupción cutánea, hinchazón, picazón o hematomas. Estos síntomas suelen desaparecer al cabo de unos días. Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene dolor, enrojecimiento o hinchazón alrededor del lugar de inyección que no desaparece en unos días o empeora
- Infecciones de las vías respiratorias superiores (incluidas infecciones de los senos paranasales)
- Dolores de cabeza
- Erupción cutánea

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de ABRILADA. Informe a su proveedor de atención médica sobre cualquier efecto secundario que le moleste o que no desaparezca. Para obtener más información, consulte a su proveedor de atención médica o farmacéutico.



No es una paciente o proveedor de atención médica real.

¿Qué debo hacer si presento efectos secundarios?

Comuníquese con el consultorio del médico de inmediato si desarrolla algún síntoma de infección. Asimismo, informe a su médico si presenta alguna afección médica nueva o que empeore. Asegúrese de notificar cualquier hematoma, sangrado, fiebre persistente o síntomas de infección. Busque atención médica inmediata si desarrolla una reacción alérgica grave.

Le animamos a informar los eventos adversos relacionados con los productos de Pfizer llamando al 1-800-438-1985 (solo EE. UU.). Si prefiere, puede comunicarse directamente con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los EE. UU. Visite www.fda.gov/MedWatch o llame al 1-800-FDA-1088.


Consulte la [Guía del medicamento](#) para obtener más información.

¿Debo evitar cualquier otro medicamento mientras recibo ABRILADA?

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que usa, incluidos los medicamentos de venta con receta y los de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de plantas medicinales. En particular, informe a su proveedor de atención médica si usa:

- Orenzia[®] (abatacept), Kineret[®] (anakinra), Remicade[®] (infliximab), Enbrel[®] (etanercept), Cimzia[®] (certolizumab pegol) o Simponi[®] (golimumab) porque no debe usar ABRILADA mientras esté usando también uno de estos medicamentos.
- Rituxan[®] (rituximab). Es posible que su proveedor de atención médica no quiera darle ABRILADA si ha recibido Rituxan recientemente.
- Imuran[®] (azatioprina) o Purinethol[®] (6-mercaptopurina, 6-MP).

Consulte la [Información seleccionada de seguridad en todo el documento](#), [las Indicaciones de la página 3](#) y la [Información de prescripción completa](#), [incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIAS](#), la [Guía del medicamento](#) y las [Instrucciones de uso](#), disponibles en ABRILADA.com.



No son pacientes reales.

INFORMACIÓN SELECCIONADA DE SEGURIDAD

Los efectos secundarios frecuentes de ABRILADA incluyen reacciones en el lugar de inyección (dolor, enrojecimiento, erupción cutánea, hinchazón, picazón o hematomas), infecciones de las vías respiratorias superiores (incluidas infecciones de los senos paranasales), dolores de cabeza y erupción cutánea. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de ABRILADA. Informe a su médico sobre cualquier efecto secundario que le moleste o que no desaparezca.

Recuerde, informe a su médico inmediatamente si tiene una infección o síntomas de una infección, incluidos:

- Fiebre, sudores o escalofríos
- Dolores musculares
- Tos
- Disnea
- Sangre en flema
- Pérdida de peso
- Piel o llagas calientes, enrojecidas o dolorosas en su cuerpo
- Diarrea o dolor de estómago
- Ardor al orinar
- Orinar con más frecuencia de lo normal
- Sensación de mucho cansancio

ABRILADA se administra mediante una inyección bajo la piel.

Esta es la información más importante que debe saber sobre ABRILADA. Para obtener más información, hable con su proveedor de atención médica.

USOS

ABRILADA es un medicamento de venta con receta que se utiliza:

- Para reducir los signos y síntomas de:
 - Artritis reumatoide (AR) de moderada a grave en adultos. ABRILADA se puede usar solo, con metotrexato o con algunos otros medicamentos. ABRILADA puede prevenir más daños en sus huesos y articulaciones y puede ayudarle a realizar sus actividades cotidianas.
 - Artritis idiopática juvenil (AIJ) poliarticular de moderada a grave en niños de 2 años o más. ABRILADA se puede usar solo o con metotrexato.

- Artritis psoriásica (APs) en adultos. ABRILADA se puede usar solo o con algunos otros medicamentos. ABRILADA puede prevenir más daños en sus huesos y articulaciones y puede ayudarle a realizar sus actividades cotidianas.
- Espondilitis anquilosante (EA) en adultos.
- Hidradenitis supurativa (HS) de moderada a grave en adultos.
- Para tratar la enfermedad de Crohn (EC) de moderada a grave en adultos y niños de 6 años o más.
- Para tratar la colitis ulcerosa (CU) de moderada a grave en adultos. Se desconoce si los productos de adalimumab son eficaces en personas que dejaron de responder o no pudieron tolerar los medicamentos anti-TNF.
- Para tratar la psoriasis en placas (Ps) crónica de moderada a grave en adultos que estén listos para recibir terapia sistémica o fototerapia, y que estén bajo la atención de un médico que decida si otras terapias sistémicas son menos adecuadas.
- Para tratar la intermedia no infecciosa (parte media del ojo), posterior (parte posterior del ojo) y panuveítis (todas las partes del ojo) en adultos.

Consulte la Información de prescripción completa, incluida la Guía del medicamento, para ABRILADA.

Le animamos a informar los eventos adversos relacionados con los productos de Pfizer llamando al 1-800-438-1985 (solo EE. UU.). Si prefiere, puede comunicarse directamente con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los EE. UU. Visite <http://fda.gov/MedWatch> o llame al 1-800-FDA-1088.

Consulte la Información seleccionada de seguridad en todo el documento, las Indicaciones de la página 3 y la Información de prescripción completa, incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIAS, la Guía del medicamento y las Instrucciones de uso, disponibles en ABRILADA.com.



No es un paciente o proveedor de atención médica real.

Cobertura del seguro y ayuda financiera para su receta de ABRILADA

¿Está ABRILADA cubierto por mi seguro?

ABRILADA puede estar cubierto por su seguro, lo cual puede comprobarse antes de su primera inyección.

Pfizer enCompass[®] ofrece una variedad de recursos de apoyo para ayudarle a evaluar su cobertura de seguro y responder a las preguntas adicionales relacionadas con la cobertura que pueda tener.



Pfizer enCompass proporciona recursos de acceso y reembolso, apoyo y materiales educativos para ABRILADA.

Un equipo de asesores de acceso capacitados está disponible para ayudarle a comprender los beneficios de su seguro y para trabajar con su proveedor de atención médica y la compañía de seguro médico en su nombre para que tenga acceso al tratamiento con ABRILADA.

Para evaluar su cobertura de seguro para ABRILADA o sus necesidades de apoyo, comuníquese con un Asesor de acceso por teléfono al 1-844-722-6672, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m., hora del este, o visite www.PFIZERenCompass.com.

Consulte la Información seleccionada de seguridad en todo el documento, las Indicaciones en la página 3 y la Información de prescripción completa, incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIAS, la Guía del medicamento y las Instrucciones de uso, disponibles en ABRILADA.com.

Programa de asistencia para copagos de Pfizer enCompass para ABRILADA

El programa de asistencia para copagos de Pfizer enCompass para ABRILADA proporciona a las personas con seguro comercial elegibles, un beneficio máximo de entre \$4,000 y \$14,000 por año calendario para gastos de bolsillo.

Si es elegible, puede pagar tan solo \$0 por cada tratamiento de ABRILADA.

Los beneficiarios de atención médica federal y estatal no son elegibles. Solo seguro privado. El programa para copagos solo cubre los costos del fármaco, no los procedimientos, las tarifas de administración ni las visitas al consultorio. Se requiere inscripción. Consulte los Términos y condiciones* completos más abajo.

***Términos y condiciones:** Al utilizar este programa, usted reconoce que actualmente cumple los requisitos de elegibilidad y cumplirá los términos y condiciones siguientes:

El programa de asistencia para copagos de Pfizer enCompass para ABRILADA no es válido para los pacientes que están inscritos en un programa de seguros financiado a nivel estatal o federal, incluidos, entre otros, Medicare, Medicaid, TRICARE, atención médica de Asuntos de Veteranos (Veterans Affairs), un programa de asistencia para fármacos de venta con receta estatal, o el Plan de seguro médico gubernamental disponible en Puerto Rico (anteriormente conocido como "La Reforma de Salud"). La oferta del programa no es válida para los pacientes que pagan en efectivo. Los pacientes a los que se les recetó ABRILADA para la hidradenitis supurativa (HS) adolescente, la uveítis pediátrica o la colitis ulcerosa pediátrica no son elegibles para este programa de ahorro de copago. Con este programa, los pacientes elegibles pueden pagar un copago de tan solo \$0 por tratamiento con ABRILADA, sujeto a un beneficio máximo de entre \$4,000 y \$14,000 por año de calendario por gastos de bolsillo para ABRILADA, en función de su seguro, incluidos los copagos o coseguro. El monto de cualquier beneficio es la diferencia entre su copago y \$0. Una vez alcanzado el beneficio máximo, deberá abonar el resto de los gastos mensuales de su bolsillo. El paciente debe tener un seguro privado con cobertura de ABRILADA. Esta oferta no es válida cuando el costo completo de su fármaco de venta con receta sea elegible para ser reembolsado por sus planes de seguro privado u otros programas de beneficios de salud o de farmacia privados. Debe deducir el valor de esta asistencia de cualquier solicitud de reembolso presentada a su plan de seguro privado, ya sea directamente por usted o en su nombre. Usted es responsable de reportar el uso del programa a cualquier aseguradora privada, plan médico u otro tercero que pague o reembolse cualquier parte de la receta surtida mediante el uso del programa, según se requiera. No debe usar el programa si su aseguradora o plan médico prohíbe el uso de programas de asistencia para copagos del fabricante. Este programa no es válido cuando lo prohíba la ley. Este programa no se puede combinar con ningún otro ahorro, ensayo gratuito ni oferta similar para la receta especificada. **La tarjeta de copago solo se aceptará en las farmacias participantes. Si su farmacia no participa, es posible que pueda enviar una solicitud de reembolso en relación con esta oferta. El formulario de reembolso se puede encontrar en <https://patient.pfizerandicopay.com>. Este programa no es un seguro de salud.** Este programa es válido solo en los EE. UU. y en Puerto Rico. Este programa se limita a 1 por persona durante este período de oferta y no es transferible. Esta oferta no se puede canjear más de una vez por cada 30 días por paciente. No es necesario hacer ninguna otra compra. Los datos relacionados con su reembolso del programa de asistencia podrán recopilarse, analizarse y compartirse con Pfizer, para investigación de mercado y otros fines relacionados con la evaluación de los programas de Pfizer. Los datos compartidos con Pfizer no se consolidarán y anonimizarán; se combinarán con los datos relacionados con otros reembolsos de asistencia y no lo identificarán. Pfizer se reserva el derecho de rescindir, revocar o enmendar este programa sin aviso previo. Es posible que este programa no esté disponible para los pacientes en todos los estados. Para obtener más información sobre Pfizer, visite www.pfizer.com. Para obtener más información sobre el programa de asistencia para copagos de Pfizer enCompass, llame a Pfizer enCompass al 1-844-722-6672 o escriba a Pfizer enCompass Co-Pay Assistance Program 2730 S. Edmonds Lane, Suite 300, Lewisville, TX. La Tarjeta y el Programa vencen el 31/12/2024.



¿Existe una aplicación móvil que pueda ayudarme a gestionar mi terapia?

La aplicación **All in 1** es una aplicación móvil gratuita, diseñada para ayudarle a llevar un seguimiento de sus inyecciones y síntomas a lo largo de su proceso de tratamiento.

All in 1

La aplicación **All in 1** incluye:

- Un **calendario personalizable** que le permite llevar un registro de los detalles de la inyección y recibir recordatorios importantes
- Capacitación individual para ayudar a comprender las técnicas de inyección adecuadas de las **Guías del personal de enfermería***
- Una forma sencilla de llevar un **registro de los detalles clave** —como sus síntomas— que puede compartir con su médico

Para descargar la aplicación **All in 1**, visite su tienda de aplicaciones móviles.



App Store es una marca de servicio de Apple Inc. registrada en los EE. UU. y en otros países. Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

*Se requiere inscripción en Pfizer enCompass®.

Para obtener más información sobre ABRILADA,
visite www.ABRILADA.com

Las marcas incluidas en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios.